



วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ เอโดซี

วิธีรับประทานที่เหมาะสม

ให้คำนวณจากน้ำหนักตัวของผู้ดื่ม

โดยเปรียบเทียบจากน้ำหนักตัว ในอัตราส่วน 10 กก. ต่อ เอโดซี 1 หยด

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าน้ำหนักตัวเราอยู่ที่ 50 กก. ให้ดื่ม เอโดซี 5 หยด เป็นต้น

หยด เอโดซี ลงในน้ำสะอาดปริมาณต่อน้ำครึ่งแก้ว เขย่าแก้ว แล้วทิ้งไว้ 5-15 นาที วันละ 2-3 ครั้ง ตอนท้องว่าง เช่น ตื่นนอน กลางวัน และเย็น สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้วควรทานก่อนนอนเพิ่มอีก 1 ครั้ง

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไต และโรคหัวใจ

ควรเริ่มต้นดื่ม เอโดซี ที่วันละ 1 หยด ก่อน

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ Adoxy

1.ใช้รับประทานหยด เอโดซี จำนวน 3-5 หยด ลงในน้ำสะอาดปริมาณต่อน้ำครึ่งแก้ว เขย่าแก้ว แล้วทิ้งไว้ 5-15 นาที แล้วจึงดื่ม ควรดื่มให้หมดให้หมดภายใน 3 ชั่วโมง ดื่มวันละ 3-4 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า, กลางวัน, เย็น และก่อนนอนหรือขณะท้องว่าง ไม่ควรรับประทานร่วมกับ ชา กาแฟ หรือ นม (ใช้ผสมน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นที่ยังไม่ได้อุ่นผ่านการต้มก็ได้)

สำหรับท่านที่เป็นโรคเบาหวาน ต้องดื่มให้ได้มี้อละ 10 หยด วันละ 4 มี้อ คือ ก่อนอาหารเช้า, กลางวัน, เย็น และก่อนนอน (แต่ให้เริ่มต้น ดื่ม ที่ 5 หยดต่อมี้อก่อน แล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นไปจนถึง 10 หยด)

สำหรับผู้ที่เป็นแผลเบาหวาน หรือแผลเรื้อรัง ต้องผสมเอโดซีที่ปริมาณ 2-3หยด ในขวดสเปรย์ การพ่นแผล ต้องพ่นให้ได้อย่างน้อยวันละ 6 ครั้ง และต้องดื่มเอโดซีควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้ได้ผลดีและได้ผลเร็ว

สำหรับท่านที่เป็นโรคมะเร็ง ต้องดื่มให้ได้มี้อละ 30 หยด วันละ 4 มี้อ คือ ก่อนอาหารเช้า, กลางวัน, เย็น และก่อนนอน (แต่ให้เริ่มต้น ดื่ม ที่ 5 หยดต่อมี้อก่อน แล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นไปจนถึง 30 หยด)

สำหรับผู้ที่เป็นแผลที่เกิดจากมะเร็ง หรือแผลเรื้อรัง ต้องผสมเอโดซีที่ปริมาณ 20-30 ในขวดสเปรย์ ต้องพ่นแผลทุกครั้ง
ที่แผลแห้ง ต้องพ่นให้ได้อย่างน้อยวันละ 6 ครั้ง และต้องคั้นเอโดซีควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้ได้ผลดีและได้ผลเร็ว
ข้อควรระวัง :

- ห้ามผสม เอโดซี กับน้ำที่ต้มแล้ว หรือน้ำร้อน โดยเด็ดขาด เพราะ น้ำที่ต้มแล้วจะไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่
- ภาชนะที่ใช้ต้องเป็นภาชนะที่เป็นแก้วเท่านั้น ไม่ควรใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติกหรืออลูมิเนียม เพราะ เอโดซี เป็นกรดอะมิโน ซึ่งจะมีปฏิกิริยากับภาชนะที่เป็นพลาสติกและอลูมิเนียม

2. ใช้ภายนอกร่างกาย

หยด เอโดซี จำนวน 3-5 หยด ในขวดสเปรย์ที่บรรจุน้ำสะอาด เขย่าให้เข้ากัน ให้สเปรย์บนส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ผิวกาย ใต้ลิ้น โปรงจมูก ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับบาดแผลหรือบริเวณที่เกิดผื่นคันได้ด้วย ถ้าใช้กับผิวหนัง เราควรผสมให้เจือจางประมาณ 1 หยด พ่นทุกครั้งหลังอาบน้ำ หรือทุกครั้งที่ต้องการความสดชื่น

การเก็บรักษา เอโดซี

- ควรเก็บไว้ในสถานที่ ที่มีอุณหภูมิปกติ ห้ามเก็บไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรือชื้น
- ห้ามเก็บไว้ร่วมกับอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เอโดซีเสื่อมคุณภาพ
- ห้ามเก็บไว้ใกล้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, เครื่องเสียง, ตู้เย็น เป็นต้น โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เอโดซีเสื่อมคุณภาพ

อาการที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่เริ่มดื่มสำหรับผู้ผลิตภัณฑ์ Adoxy
(ให้ดื่มต่อเนื่องอาการเหล่านี้จะหายไปภายในระยะเวลา 1 อาทิตย์)

อาการ	มีปัญหาเกี่ยวกับ
1. ง่วงนอน	ตับ หรือ ปอด
2. เหนื่อยและอ่อนเพลีย	หัวใจ
3. อาเจียน	ระบบการย่อยหรือกระเพาะ
4. มีน ปวดศีรษะ	ความดันโลหิต / ปอด
5. มีไข้	ความดัน/ความเข้มข้นของโลหิตไม่สมดุลย์
6. มีแก๊สในกระเพาะอาหาร	ลำไส้เล็ก / ใหญ่
7. มีเหงื่อออก	ความร้อนในร่างกายไม่สมดุลย์
8. ท้องร่วง	น้ำดี / ตับ
9. เจ็บคอ	ปอด/ต่อมทอลซิล

10. คอแห้ง	โลหิต
11. ปวดตามข้อและร่างกาย	เส้นโลหิต
12. มีอาการบวม	ไต
13. ปวดบั้นเอว	ไต
14. อุจจาระมีเลือด	ทวารหนัก/ลำไส้ใหญ่
15. ท้องผูก	ลำไส้ใหญ่
16. ปัสสาวะมีกลิ่นฉุน	ไต
17. ปัสสาวะขุ่น	เส้นโลหิต/ไต
18. น้ำตาลในเลือดเพิ่ม	ไต
19. ความดันโลหิตเพิ่ม	ไต
20. เบื่ออาหาร	ตับอ่อน
21. รับประทานอาหารได้มากขึ้น	ระดับคอเรสเตอรอลเปลี่ยนแปลง
22. ประจำเดือนมาผิดปกติ	ม้าม
23. คับบริเวณตา	เส้นประสาทตา / ไต
24. คับบริเวณจมูก	โพรงจมูก / ระบบหายใจบกพร่อง
25. มีผื่นและคัน	เส้นโลหิต
26. ปวดศีรษะมาก	ไมเกรน

<http://www.adoxy.us>

โทร.080-5968108